



بنام خدا




مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی آیت الله طالقانی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی

طالقانی تبریز

حاملگی خارج رحمی



تهیه و تنظیم: فرشته شمس (کارشناس پرستاری)

گروه هدف: بیماران

تدوین: پاییز ۱۴۰۰

بازنگری: بهار ۱۴۰۳

5

مزایای تکنیک لاپاراسکوپي به لاپاراتومی این است که میزان خونریزی کمتر بوده و احتمال چسبندگی های پس از عمل کاهش می یابد و دوران نقاهت و مدت بستری در بیمارستان به زمان کمتری نیاز دارد.

منبع:

بارداری و زایمان ویلیامز

چگونه می توان از بارداری های خارج رحمی

پیشگیری کرد:

از هر نوع بیماری منتقله از راه جنسی مانند سوزاک پیشگیری کنید.

اگر سیگار مصرف می کنید و قصد باردار شدن دارید حتماً اقدام به ترک سیگار نمایید.

روش های تشخیص حاملگی خارج رحمی:

آزمایش bhcg (حاملگی)

سونوگرافی T.V

بهتر است توصیه می شود که بعد از بارداری خارج رحمی تا سه ماه بارداری به تعویق بیفتد تا وضعیت جسمی برای بارداری طبیعی کاملاً بهبود پیدا کند ۶۰ درصد این زنان طی ۱۸ ماه بعد از بیماری حاملگی طبیعی خواهند داشت. انجام لاپاراسکوپي یا لاپاراتومی با نظر پزشک معالج صورت گیرد.

4

حاملگی خارج از رحم :

به حالتی گفته می شود که تخمک لقاح یافته در جایی به غیر از جدایی داخلی رحم مستقر می شود و شروع به رشد می کند.

۹۸ درصد حاملگی های خارج از رحم درون لوله های رحمی اتفاق می افتد در نقاط دیگری مثل تخمدان گردن رحم و حفره شکمی نیز رخ می دهد اصلی ترین خطری که توسط حاملگی خارج از رحم ایجاد می شود پارگی است که به خونریزی داخلی منجر می شود .

عوامل مستعدکننده حاملگی خارج از رحمی :

۱. بیماری های التهابی لگن (pid) عفونت های لگنی

۲. سابقه ابتلا به حاملگی خارج از رحمی بالاترین نسبت که اطلاق ۱۵ درصد پس از تجربه حاملگی خارج از رحم اول و ۳۰ درصد پس از تجربه حاملگی خارج از رحم دوم

۳. آندومتریوز

۴. فیبروم

۵. چسبندگی های لگنی

۶. استفاده از IUD (۵۰ درصد زمانی که برای جلوگیری از بارداری از IUD استفاده می کنند خارج از رحم صورت می پذیرد)

علائم و نشانه های حاملگی خارج از رحم:

- درد در ناحیه شکم
- عدم موجود قاعدگی
- خونریزی واژینال یا لکه بینی
- حالت تهوع و استفراغ
- درد های تیز در ناحیه پایین شکم
- احساس درد در یکی از طرفین شکم
- احساس ضعف و سرگیجه
- احساس درد در ناحیه شانه ، گردن

اگر یکی از عوامل خطر ذکر شده را دارید سریعاً به پزشک زنان خود مراجعه کنید.

کسی که دچار بارداری خارج رحمی شده است باید تحت درمان قرار گیرد.

اگر لوله رحمی دچار آسیب و پارگی شده است و خونریزی کرده است باید سریع تشخیص داده شود و برای توقف خونریزی به اتاق عمل فرستاده شود.

برخی پزشکان بسته به میزان پارگی ایجاد شده به برداشتن نمونه رحمی اقدام می کنند اگر برای برداشتن جنین و ترمیم لوله رحمی ، لوله رحمی پاره نشده از جراحی لاپاراسکوپی استفاده می کنند. در صورت پارگی لوله رحمی که می تواند منجر به مشکل شود که معمولاً به پا و انگشتان رنگ طبیعی خود را از دست می دهند و کبود می شوند و عرق زیادی می کند و آشفته و بی قرار می شود و نفس سریع و تنفس کم می شود که پزشکان ترجیح می دهند به روش لاپاراتومی (باز کردن شکم) یا لاپاراسکوپی بیمار را جراحی کند.