



بنام خدا




مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی آیت الله مالماتی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی

طالقانی تبریز

سرکلاژ



تهیه و تنظیم: فرشته شمس

(کارشناس پرستاری)

گروه هدف: بیماران

تدوین: پاییز ۱۴۰۰

بازنگری: بهار ۱۴۰۳

5

منابع:

بارداری و لیلیامز

چکیده بیماری های زنان برک و نواک

تألیف: مریم قراچه، زهرا شاهواری

• پارگی کیسه آب

• تهوع و استفراغ

• تب بالای ۳۸ درجه یا لرز

در صورت بروز دردهای زود هنگام و زایمان زودرس باید بخیه سرکلاژ باید در این مواقع فرد در بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفته تا به موقع در خصوص باز کردن نخ بخیه اقدام شود.

قبل از شروع دردهای زایمانی ، بخیه های دهانه رحم باز می شود تا زایمان امکان پذیر باشد برداشتن بخیه ها معمولاً در انتهای حاملگی انجام می شود و یک عمل بدون درد بوده و نیاز به بی حسی یا بیهوشی ندارد و در عرض چند دقیقه انجام می گیرد.

4

## سرکلاژ :

سرکلاژ یک روش جراحی است که در موارد نارسایی دهانه رحم برای جلوگیری از باز شدن رحم و خروج محصولات حاملگی (جفت و جنین) و سقط انجام می‌گیرد.

نارسایی دهانه رحم، به حالتی گفته می‌شود که بافت دهانه رحم تحمل وزن محصولات حاملگی را نداشته و در طول حاملگی بدون هیچ گونه علامتی از قبیل درد و انقباضات رحمی و ... باز شده و باعث خروج محصولات حاملگی و سقط میشود ولی ناشی از نارسایی دهانه رحم، در اولین بارداری در سه ماهه دوم رخ می‌دهد و ممکن است هر بارداری‌های بعدی زودتر اتفاق بیفتد در اثر باز شدن دهانه رحم کیسه آب به سمت خارج از دهانی رحم برجسته شده و معمولاً وقتی دهانه رحم تا حدود ۴ سانتی متر باز شود کیسه آب پاره و انقباضات رحمی شروع می‌شود و در نهایت به خروج جفت جنین و سقط منتهی می‌شود.

## علل نارسایی دهانه رحم :

نارسایی دهانه رحم می‌تواند مادرزادی بوده و در اثر ناهنجاری‌های ساختمانی دهانه رحم ایجاد شود در بعضی مواقع به دنبال آسیب‌های وارده به دهانه رحم در اثر دستکاری‌های جراحی و درمانی، عفونت، پارگی در اثر زایمان سخت یا سقط عمدی و ... ایجاد شود.

1

نارسایی دهانه رحم معمولاً زمانی تشخیص داده می‌شود که فرد سابقه سقط‌های بدون درد در سه ماهه دوم حاملگی داشته باشد البته معاینه فیزیکی و سونوگرافی نیز در تشخیص نارسایی کمک کننده می‌باشد.

## درمان نارسایی دهانه رحم :

در نارسایی دهانه در جهت حفظ و تداوم حاملگی عمل سرکلاژ (دوختن دهانه رحم) انجام میشود و برای هر بار حاملگی ضروری است. عمل سرکلاژ از سقط و زایمان زودرس جلوگیری نموده و در ۸۵ تا ۹۰ درصد موارد موفقیت آمیز می‌باشد معمولاً بعد از هفته دوازده حاملگی انجام می‌گیرد و در صورت هرگونه شک به سقط اجتناب ناپذیری یا فراموش شده و یا پارگی کیسه آب این عمل نباید انجام شود.

نارسایی دهانه رحم موفقیت آمیز می‌باشد معمولاً بعد از هفته دوازده حاملگی انجام می‌گیرد و در صورت هرگونه شک به سقط اجتناب ناپذیری یا فراموش شده و یا پارگی کیسه آب این عمل نباید انجام شود.

2

## مراقبت‌های قبل و بعد از عمل سرکلاژ :

بیمار باید تا دو هفته بعد از عمل سرکلاژ از نزدیکی پرهیز نماید.

شب قبل از عمل باید یک شام سبک مصرف نماید و پس از آن دیگر هیچ نوع مواد خوراکی و آشامیدنی مصرف نکند.

بعد از عمل سرکلاژ معمولاً فرد چند ساعت در بخش تحت مراقبت قرار می‌گیرد و در صورت ثابت بودن وضعیت عمومی با صلاحدید پزشک مرخص می‌شود.

بیمار باید چند روز در منزل استراحت نموده و از انجام کارهای سنگین تا پایان دوران بارداری خودداری نماید انجام کارهای روزمره پس از اتمام دوره استراحت دو هفته بلامانع می‌باشد.

بعد از عمل سرکلاژ در بعضی مواقع کمی خونریزی یا لکه بینی ایجاد می‌شود که ممکن است در طی یک یا دو روز ادامه داشته و سپس قطع شود.

در صورت بروز هر یک از علائم زیر باید به پزشک معالج اطلاع داده شود:

- خونریزی واژینال
- ترشح زیاد واژینال

3