



بنام خدا




مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی آیت الله طالقانی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

## مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طالقانی تبریز

### کیستگتومی (برداشتن کیست)



تهیه و تنظیم: افسانه سلمانی (کارشناس پرستاری)

گروه هدف: بیماران

ندوین: بهار ۱۴۰۲

بازنگری: بهار ۱۴۰۳

## زمان بهبودی بعد از عمل لاپاراتومی چقدر است؟

مدت زمان بهبودی بعد از انجام عمل لاپاراتومی کیست تخمدان برابر ۲ الی ۳ روز در بیمارستان و ۶ هفته برای بهبودی کامل است.

مراقبت های بعد از جراحی باز کیست تخمدان بسیار مهم است که بعد از مرخص شدن از بیمارستان، مراقبت های لازم برای پیشگیری از عفونت انجام شده و از محل زخم به خوبی نگهداری شود. عفونت از رایج ترین عوارض عمل لاپاراتومی کیست تخمدان است، بنابراین آشنایی با علائم عفونت حائز اهمیت است.

### منابع:

چکیده بیماری های زنان برک و نواک ۲۰۱۲

تالیف: مریم قراچه، زهرا شاهواری

آموزش به بیمار ماری ام. کانابو

5

در حالت عادی، اکثر پزشکان روشی که کمترین آسیب و ریسک را داشته باشد، یعنی روش لاپاراسکوپی، را برای درمان کیست تخمدان استفاده می کنند. اما شرایط برای همه افراد یکسان نیست. ممکن است به دلایلی مثل مشکوک بودن به سرطان یا مجهول بودن ماهیت کیست، پزشک مجبور به انجام عمل لاپاراتومی یا همان عمل باز شود.

## عوارض عمل لاپاراتومی کیست تخمدان چیست؟

عوارض این عمل، مثل دیگر عمل های باز است و شامل عفونت، خونریزی و آسیب به دیگر بافت ها می شود.

4

## عمل جراحی لاپاراتومی کیست تخمدان چیست؟

لاپاراتومی یک اصطلاح کلی برای روش کلاسیک جراحی است که در آن برشی به اندازه‌ی چند سانتی‌متر در محل ایجاد می‌شود. تفاوت لاپاراسکوپي و لاپاراتومی این است که در لاپاراسکوپي برش‌های بسیار کوچکی در سطح شکم ایجاد می‌شود که دوربین از یکی سوراخ‌ها وارد شکم شده و عمل جراحی انجام می‌شود. در این حالت کمترین برش ایجاد می‌شود، اما لاپاراتومی در شرایطی انجام می‌شود که روش لاپاراسکوپي جوابگو نباشد و پزشک نیاز داشته باشد که به طور کامل به ناحیه بیمار احاطه داشته باشد، بنابراین به همان روش قدیمی ناحیه مورد نظر را شکافته و تحت عمل جراحی قرار می‌دهد.

1

## چرا لاپاراتومی کیست تخمدان انجام می‌شود؟

اگر پزشک مشکوک به سرطان باشد، لاپاراتومی کیست تخمدان انجام می‌دهد. برای انجام این عمل جراحی، برشی که چند سانتیمتر است در شکم ایجاد می‌شود. در همان حین جراحی باز کیست تخمدان، پزشک کیست را آزمایش می‌کند تا ببیند آیا سرطان‌زا است یا خیر.

اگر در حین لاپاراتومی کیست تخمدان تشخیص داد شود که کیست سرطان‌زا نیست، تنها کیست خارج می‌شود و تخمدان دست نخورده باقی خواهد ماند. اگر کیست تخمدان سرطانی باشد، احتمالاً تخمدان درگیر یا حتی در برخی موارد هر دو تخمدان برداشته‌شده و عروق خون‌رسان متصل به آن دوخته می‌شوند.

2

گاهی مواقع ممکن است محل برش عمل لاپاراتومی کوچک باشد، اما در حین جراحی پزشک مجبور شود این برش را بزرگ‌تر کند تا دسترسی بهترین نسبت به نقاط مختلف داشته باشد. در شرایطی دیگر ممکن است که عمل به صورت لاپاراسکوپي شروع شود، اما با پیش رفتن آن پزشک متوجه شود قادر به انجام عمل جراحی از طریق لاپاراسکوپي نیست و اقدام به جراحی با روش لاپاراتومی کند

لاپاراتومی داشته باشم یا لاپاراسکوپي؟

در واقع پاسخ این سؤال به خواسته ما ارتباطی ندارد و ما تعیین کننده این که کدام یک از این عمل‌ها انجام شود، نیستیم.

3