

آموزش تخلیه کیست بارتولن

سوال	جواب
۱	راجع به بیماری خود چه می دانید؟
عفونت غده بارتولن که در منتهی الیه تحتانی دو طرف مدخل واژن قرار دارد و در حالت طبیعی مسئول ترشح مواد لغزنده می باشد که در صورت عفونت شدید تبدیل به آبسه شده که اگر به آنتی بیوتیک پاسخ ندهد با عمل جراحی به درناژ و یا برداشتن غده فوق می انجامد	
۲	در مورد بهداشت فردی شما را راهنمایی کرده اند؟
حمام روزانه سرپایی تا ترمیم کامل رعایت بهداشت محل عمل و تمیز نگهداشتن لباسهای زیر و جلوگیری از تعریق	
۳	در مورد کاتتر جایگذاری شده در محل عمل به شما چه آموزشی داده اند؟
کاتتر بمدت ۶-۴ هفته در محل باقی می ماند و امکان تخلیه کیست را فراهم می کند .	
۴	از معاینه مجدد خود اطلاعی دارید؟
مراجعه به بیمارستان (پزشک جراح) ۲ هفته بعد از عمل جراحی	
۵	در مورد لزوم مراجعه مجدد چه توصیه ای به شما کرده اند؟
در صورت بروز ترشحات چرکی زیاد ، خونی ، درد پیشرونده محل عمل و تب و..	
۶	در مورد مقاربت چه توصیه ای به شما کرده اند؟
تا بهبودی کامل از انجام مقاربت پرهیزید	
۷	در مورد اهمیت نگهداری برگه خلاصه پرونده به شما آموزش داده اند؟
در صورت داشتن مشکل با در دست داشتن برگه خلاصه پرونده به بیمارستان مراجعه نماید	